

Số: 41/TB-HĐT&ĐT/DLS

Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2025

DANH MỤC CÁC THUỐC VIÊN
KHUYẾN CÁO KHÔNG NHAİ, BỂ, NGHIỀN

DS: Nguyễn Kiều Phương

DS: Bùi Thị Phương Thu

Stt	Tên thuốc	Hoạt chất	Hàm lượng	Lý do	Chú ý
01	Alsiful S.R	Alfuzosin Hydrochloride	10mg	Viên nén phóng thích kéo dài	
02	Aspirin 81	Acid acetylsalicylic	81mg	Viên nén bao tan trong ruột	
03	Beticapc 750 SR	Metformin	750mg	Viên nén giải phóng kéo dài	
04	Capelodine	Capecitabine	500mg	Viên nén bao phim, thuốc gây độc tế bào điều trị ung thư.	Thuốc gây độc tế bào điều trị ung thư. Tuyệt đôi không được nhai, nghiền do nguy cơ độc tính do tiếp xúc thuốc
05	Concor Cor 2,5mg	Bisoprolol	2.5mg	Viên nén bao phim	Không được nhai
06	Dalekine	Natri valproat	500mg	Viên nén bao phim tan trong ruột	
07	Diamicron MR	Gliclazide	30mg 60mg	Viên nén phóng thích có kiểm soát	
08	Esomeprazole	Esomeprazole	20mg	Viên nang kháng acid dạ dày	
09	Escin 20mg	Escin	20mg	Viên nén bao tan trong ruột	
10	Exforge	Amlodipine + Valsartan	5mg + 80mg	Viên nén bao phim	Không bể được và không thể chia làm các liều

					bằng nhau
11	Floesty	Tamsulosine	0,4mg	Viên nén phóng thích kéo dài	
12	Forxiga	Dapagliflozin	5mg 10mg	Viên nén bao phim	Uống nguyên viên thuốc, không bẻ viên thuốc
13	Glumeron 30 MR	Gliclazide	30mg	Viên nén giải phóng - có kiểm soát	
14	Imidu 60mg	Isosorbid	60mg	Viên nén tác dụng kéo dài	Viên có thể bẻ đôi nhưng không được nhai hoặc nghiền
15	Iressa	Gefitinib	250mg	Viên nén bao phim	Trường hợp không thể uống nguyên viên thuốc thì có thể phân tán viên thuốc trong nước. Không được nghiền viên thuốc, thả nguyên viên thuốc trong nửa ly nước. Khuấy đều cho đến khi viên thuốc phân tán hoàn toàn (khoảng 20 phút) và uống dịch thuốc ngay lập tức sau khi thuốc phân tán hoàn toàn (nghĩa là trong vòng 60 phút).
16	Harnal Ocas	Tamsulosine	0,4mg	Viên nén phóng thích chậm	
17	Lazibet MR 60	Gliclazide	60mg	Viên nén phóng thích kéo dài	Được uống nửa viên hoặc cả nguyên viên, không nhai hoặc làm vỡ viên thuốc
18	Lansoprazol	Lansoprazol	30mg	Viên nang cứng kháng acid dạ dày	
19	LevoDHG 500	Levofloxacin	500mg	Viên nén bao	Không nghiền nát mà

				phim.	nuốt nguyên viên với một lượng nước vừa đủ
20	OpeVerin	Mebeverin	135mg	Viên nén bao phim	Nuốt viên thuốc với nước. Không nhai thuốc.
21	Ozanier	Levofloxacin	500mg	Viên nén bao phim	Không nghiền nát viên thuốc, có thể chia viên thuốc theo vạch khắc trên viên để phù hợp với liều dùng.
22	Metformin Stella 1000mg	Metformin	1000mg	Viên nén phóng thích kéo dài	
23	Milepsy 200	Natri valproat	200mg	Viên nén bao phim tan trong ruột	
24	Navelbine	Vinorelbine	30mg	Viên nang mềm, thuốc điều trị ung thư, thuốc có tính chất kích ứng mạnh.	Uống nguyên viên. Không nhai, nghiền viên thuốc. Không được để chất này tiếp xúc với da, niêm mạc miệng hoặc mắt
25	NifeHexaL 30 LA	Nifedipin	30mg	Viên nén bao phim tác dụng kéo dài	
26	Nifedipin Hasan 20 Retard	Nifedipin	20mg	Viên nén bao phim tác dụng kéo dài	
27	Savi Benzafibrate 200	Benzafibrate	200mg	Theo khuyến cáo nhà sản xuất	Vạch trên viên thuốc không nhằm mục đích bẻ đôi chia liều
28	Stadnex 40	Esomeprazole	40mg	Viên nén bao tan trong ruột	
29	Pantoprazol	Pantoprazol	40mg	Viên nang cứng kháng acid dạ dày	
30	Meyerapagil	Magnesi + Kali	140 mg + 158 mg	Viên nén bao phim	Uống nguyên viên, không được nhai

31	Perglim M-1	Glimepirid + metformin	1mg + 500mg	Viên nén phóng thích chậm	
32	Pradaxa	Dabigatran	110mg	Viên nang cứng	Không mở viên nang

Tài liệu tham khảo: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT



Trần Hoán Toàn

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

Me

DS. CKII. Võ Minh Cường

BP DLS & TT

gk
DS. Bùi Thị Phương Thu